

zoetis

Barrage®

Carrapaticida e mosquicida piretróide.

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Barrage® é um concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfa-ciano-3-fenoxiben-zil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (Cipermetrina) por litro. **Barrage®** é facilmente emulsionável em água.

Deve ser usado em pulverização, podendo ser aplicado em pulverizadores manuais ou motorizados. É ativo contra todos os tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas, inclusive às linhagens resistentes à carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade.

Barrage® é muito eficaz contra a "mosca-do-chifre" (*Haematobia irritans*).

Instruções de Uso:

Em pulverização: Diluir 1 mL de **Barrage®** em 1 Litro de água a ser utilizado, misturando bem. Banhar toda a superfície do animal, especialmente as regiões mais sujeitas às infestações por moscas ou carrapatos, tais como: orelhas, barbela, entre membros, virilhas e inserção da cauda. Usar sempre pulverizadores com boa pressão e digirir o jato no sentido contrário aos pêlos. Recomenda-se a dose de 5 litros de produto diluído para cada bovino adulto.

Intervalos entre as aplicações: Os tratamentos podem ser repetidos a cada 4 ou 5 semanas.

Precauções no Manuseio: • Evitar a contaminação de alimentos e material de ordenha. • Evitar contato com a pele do operador, especialmente antes de diluir o produto. • Evitar fumar quando estiver pulverizando. • Não usar a embalagem vazia. • Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. • Evitar pulverização contra o operador. • Lavar as mãos e a pele exposta antes de comer, beber ou fumar e após o trabalho. • Produto tóxico para peixes. • Não contaminar cursos d'água. • Procurar queimar ou enterrar as embalagens vazias.

Barrage® deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

Apresentação de 20 mL: Após aberto, utilizar todo o conteúdo.

Apresentação de 1 Litro: Após aberto, utilizar todo o conteúdo em até 3 meses.

Após a diluição do produto em água, utilizar todo o conteúdo imediatamente. Qualquer conteúdo remanescente do produto diluído deve ser descartado.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Primeiros Socorros (Tratamento de Contaminação Acidental): Remover imediatamente as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Se o produto atingir os olhos, lavar-se imediatamente com água durante 15 minutos e chamar o médico.

Antídoto (Informação para Médicos):

Não há antídoto específico. Tratar sintomaticamente.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA PARA USO MÉDICO: 0800 014 8110

Apresentações: Frasco plástico e de vidro de 20 mL e frasco plástico de 1 Litro.

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 1.392, em 06/07/81.

Fabricante: Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP



CUIDADO VENENO

zoetis

Proprietário:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31 - Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Dr. Renato Beneduzzi Ferreira

Médico Veterinário - CRMV-SP nº 1695

SAC 0800 011 1919